

Riskirühmad, keda võib COVID-19 vastu vaksineerida haiglas

Taust

Immunoprofülaktika ekspertkomisjon on määratlenud riskirühmade loetelu, kes oma vanuse või tervises seisundi poolest kuuluvad COVID-19 riskirühma. Riskirühmade vaksineerimine toimub eelkõige perearstikeskustes. Sellegipoolest on teatud riskirühma kuuluvad inimesed rohkem haigla vaateväljas ning nende vaksineerimine võib olla mõistlik korraldada haiglatingimustes.

Üldjuhul kehtib printsiip, et teine doos tuleks manustada samas kohas, kus manustati esimene. Kui see ei ole võimalik (nt haigla asub inimese elukohast kaugel, teises maakonnas vms), tuleb teise doosi manustamiseks eraldi kokku leppida inimese perearstiga.

Täiskasvanute ja > 16 aastaste laste riskirühmad, keda võib ka haiglas vaksineerida

täiskasvanud:

- hemodialüüsi patsiendid
- onkoloogilised haiged, kes saavad keemia-või kiiritusravi
- reumaatilised/süsteemse sidekoehaigustega patsiendid, kes saavad bioloogilist ravi
- tuberkuloosipatsiendid ja psühhiaatrilised haiged, kes pikalt haiglaravil
- organsiirdamise läbinud patsiendid
- sclerosi multiplexi biol. ravi saavad patsiendid
- organsiirdamisele minevad patsiendid
- primaarse immuunpuudulikkusega patsiendid
- tsüstilise fibroosiga patsiendid

> 16 a vanused krooniliste haigustega lapsed, keda võib haigla tingimustes vaksineerida:

- rasvumus
- raske geneetiline haigus
- raske neuroloogiline haigus
- raske ainevahetushaigus
- kaasasündinud südamerike
- diabeet
- krooniline neeruhaigus
- krooniline maksahaigus
- astma jt kroonilised kopsuhaigused
- primaarne ja sekundaarne immuunpuudulikkus (ka ravimitest indutseeritud)