

Immunoprofülakтика ekspertkomisjoni 5.10.2021 koosoleku päevakord ja ettepanekud

PÄEVAKORD

1. Ülevaade COVID-19 vaksineerimisest ja haigestumisest
2. COVID-19 vaktsiini tõhususdooside manustamine

ETTEPANEKUD

1. COVID-19 vastasel vaksineerimisel on jätkuvalt kindlalt prioriteediks esimeste ja teiste doosidega vaksineerimine.

2. COVID-19 vaktsiini tõhususdoosid

COVID-19 vaktsiini tõhususdoosidega vaksineerimine võib olemasolevate andmete põhjal aidata vähendada COVID-19 haigusesse nakatumist ning eriti vanemaealiste puhul vähendada ka haiglaravivajadust. Tervishoiu ja hoolekande sektoris võib tõhususdoosidega vaksineerimine tagada parema toimepidevuse. Seda, millisel määral on täpsemalt COVID-19 vaktsiinide tõhususdoosidega vaksineerimisega võimalik COVID-19 haigusest tingitud hospitaliseerimisi ja nakatumisi ära hoida, ei ole hetkel veel teada. Käimasolevad uuringud annavad täiendavaid andmeid. Tõhususdoosi manustamisel tuleb arvesse võtta ka seda, et väga harvade kõrvaltoimete esinemise risk tõhususdoosi manustamise järgselt on hetkeseisuga teadmata.

2.1. COVID-19 vaktsiini tõhususdoosiga vaksineerimine on soovitatav üle 65-aastastele inimestele ja hoolekandeesutuste elanikele (18+) mitte varem kui 6 kuu möödumisel esmase vaksineerimiskuuri lõpetamisest.

2.2. Immuunpuudulikkusega inimestel on soovitatav manustada COVID-19 vaktsiini tõhususdoos mitte varem kui 6 kuu möödumisel esmase vaksineerimiskuuri lõpetamisest (st COVID-19 vaktsiini lisadoosi saamisest).

2.3. Vaksineerimiskuuri läbinud alla 65-aastastel inimestel on COVID-19 raske haiguskulu risk reeglina madal. Üle 18-aastaseid inimesi võib nende soovi korral tõhususdoosiga vaksineerida mitte varem kui 8 kuu möödumisel esmase vaksineerimiskuuri läbimisest, arvestades ka teisi riskifaktoreid.

2.4. COVID-19 haiguse läbipõdenud ja ühe või kahe doosiga vaksineeritud või korduvnakatunud inimeste tõhususdoosi vajaduse kohta andmed puuduvad. Immuunpuudulikkusega patsientide osas on soovitatav nõu pidada immunoloogiga.

2.5. COVID-19 vaktsiini tõhususdoosideks on praegu võimalik kasutada Pfizer/BioNTechi vaktsiini Comirnaty sõltumata sellest, millise vaktsiiniga on esmane vaksineerimiskuur läbitud.