

Immunoprofülakтика ekspertkomisjoni soovitused 26.02.2021

1. COVID-19 haiguse läbipõdenuid vaktsineerida 1 doosiga nädal kuni kuus kuud pärast tervenemist. Lugeda läbipõdenuid ja 1 doosiga vaktsineeritud vaktsineerituteks järgmise 6 kuu jooksul.
2. Inimestele, kes pärast esimese vaktsiinidoosi manustamist COVID-19 haigusesse haigestuvad, teist doosi ei manustata ning loetakse inimene vaktsineerituks järgmise 6 kuu jooksul.
3. COVID-19 lähikontaktsete puhul oodata enne vaktsineerimist ära lähikontaktsuse perioodi lõpp.
4. Tartu Ülikooli Lastekliinikul, Tallinna Lastehaiglal ja Ida-Tallinna Keskhaiglal võimaldada vaktsineerimist vähihaigete ja geneetilise primaarse immuunpuudulikkusega laste vanematele, kuivõrd lapsi ennast hetkel vaktsineerida ei saa. Vaktsineerimise korraldab haigla.
5. Enne Pfizer/BioNTechi teise doosi manustamise aja võimaliku edasi lükkamise arutamist analüüsida selle kasu ja riske, sh efektiivsust ja selle muutumist sõltuvalt teise doosi manustamise ajast, võttes arvesse ka teisi aspekte (vaktsineerimise korraldus, kommunikatsioon jne).
6. Jätkata AstraZeneca COVID-19 vaktsiini kasutamist alla 70-aastaste inimeste vaktsineerimiseks.