

Ukraina põgenike vaksineerimine Eestis (06.03.2023)

- Eestisse saabunud Ukraina põgenikke vaksineeritakse tasuta Eesti immuniseerimiskava <https://www.riigiteataja.ee/akt/129122022070> vaktsiinidega (sh HPV vaktsiiniga). Vaksineerimine on vabatahtlik, kuid rangelt soovitatav.
- Enne vaksineerimist kontrollib tervishoiutöötaja inimese tervisedokumente. **Kui puudub vaksineerimist kajastav dokument, siis lähtume kodaniku/lapsevanema poolt antud informatsioonist varasema vaksineerimise osas.**
- Kui kodanik/lapsevanem ei ole varasemast vaksineerimisest teadlik või teadaolevalt ei ole vaksineerimist varasemalt teostatud, siis võib alustada vaksineerimist algusest vastavalt Eesti [Immuniseerimiskava rakendusjuhis](#) toodud hilinevad immuniseerimiste alaosal.
- Eestis teostatud vaksineerimise andmed edastatakse immuniseerimisteatisena TISI.
- **Tervishoiuteenuse osutaja teeb nõuetekohase sissekande Eesti immuniseerimispassi ja väljastab selle pagulasele, et jääks paberkandjal dokument, mis kehtib edaspidi Ukrainas ja teistes riikides.** Perearstil/haiglas peab olema „kollaste passi“ blankettide varu, neid võib tellida Terviseametilt koos vaktsiinidega.

Laste vaksineerimine

- Lapsed vaksineeritakse perearstikeskuses, koolitervishoiuteenust osutava õe juures või laste vaksineerimisega tegelevates haiglates.
- Lapsed vaksineeritakse vastavalt Eesti immuniseerimiskavale ja immuniseerimiskava rakendusjuhisele. Immuniseerimisega jätkatakse sealt, kus see on pooleli jäänud.

Ukraina ja Eesti immuniseerimiskava võrdlus

Ukraina immuniseerimiskava		Eesti immuniseerimiskava Ukraina lastele	
Vanus	Vaktsiin	Vanus	Vaktsiin
1 päev	HepB1	1 päev	HepB*
3-5 päeva	BCG	3-5 päeva	BCG
		2 kuud	RV1
2 kuu	DTPa-IPV-Hib-HepB2	3 kuud	DTPa-IPV-Hib-HepB1 ja RV2
4 kuud	DTPa-IPV-Hib	4,5 kuud	DTPa-IPV-Hib-HepB2 ja RV3**
6 kuud	DTPw ja OPV ja HepB3	6 kuud	DTPa-IPV-Hib-HepB3
12 kuud	MMR1 ja Hib	1 aasta	MMR1
18 kuud	DTPa-IPV või DTPw ja OPV	1,5-2 aasta	DTPa-IPV-Hib-HepB4
6 aastat	MMR2 ja dT ja OPV	6-7 aastat	DTPa-IPV
		12 aastat	HPV1,2
14 aastat	OPV	13 aastat	MMR2
16 aastat	dT	15-16 aastat	dTpa

* Üksnes HbsAg-positiivsetel või raseduse ajal B-virushepatiidi suhtes analüüsimate emadel sündinud riskirühma kuuluvad imikud

** Üksnes rotaviirusnakkuse viievalentse vaktsiini korral

Immuniseerimiskava rakendusjuhised on siin [Immuniseerimiskava rakendusjuhised](#). Hilinenud immuniseerimiste alaosa on selles juhendis lk 13-17.

Gripi vastane vaktsineerimine

- Kõigile Ukraina lastele vanuses 6 kuud kuni 7 eluaastat (k.a) on gripi vastane vaktsineerimine tasuta.
- 8-aastastele kuni 19-aastastele (k.a) gripi riskirühma kuuluvatele Ukraina lastele ja noorukitele on gripi vastane vaktsineerimine samuti tasuta.

Täiskasvanute vaktsineerimine

- Täiskasvanuid vaktsineeritakse perearstikeskuses, haiglas või erameditsiinisutuses.
- Täiskasvanuid vaktsineeritakse dT, MMR ja COVID-19 vaktsiinidega. Täiskasvanutele on need vaktsiinid tasuta.

COVID-19

Ukrainas on kasutusel Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Spikevax (Moderna), Vaxzevria (AZ) ja CoronaVac (Sinovac) vaktsiinid. Enamik inimesi on vaktsineeritud CoronaVac-ga.

- Seni vaktsineerimata täiskasvanuid tuleb vaktsineerida Comirnaty Originaal/Omicron BA.4-5, Spikevax Originaal/Omicron BA. 4-5, Comirnaty (Pfizer/BioNTech), või Nuvaxovid (Novavax) vaktsiini kahe doosiga. Patsiendi erisoovil võib ta vaktsineerida Janssen vaktsiiniga.
- CoronaVac (Sinovac) või Vaxzevria (AZ) vaktsiinidega alustatud esmase vaktsineerimiskuuri võib lõpetada Comirnaty Originaal/Omicron BA.4-5, Spikevax Originaal/Omicron BA. 4-5, Comirnaty (Pfizer/BioNTech) Comirnaty (Pfizer/BioNTech) või Nuvaxovid (Novavax) vaktsiinidega.
- Tõhusdoosina kasutada Comirnaty Originaal/Omicron BA.4-5 või Spikevax Originaal/Omicron BA. 4-5, Comirnaty (Pfizer/BioNTech) vaktsiini. Erandjuhtudel (näiteks allergiline reaktsioon mRNA vaktsiinile) võib vaktsineerija kasutada selleks Novavax vaktsiini.
- **CoronaVac (Sinovac) COVID-19 vastase vaktsiiniga esmase vaktsineerimiskuuri läbinud 18+ inimestele võimaldada tõhusdoos alates kahe kuu möödumisest esmasest vaktsineerimiskuurist. Möödapääsmatus olukorras (nt inimene liigub Eestist edasi riikidesse, kus aktiveeritakse vaid EL-s müügiloo saanud COVID-19 vaktsiine) võib manustada tõhusdoosi vähemalt 4 nädala möödumisel esmasest vaktsineerimiskuurist.**
- AstraZeneca, Pfizer/BioNTechi ja Moderna vaktsiiniga esmase vaktsineerimiskuuri läbinud 18+ elanikkonnale võimaldada tõhusdoos alates kuu kuu möödumisest esmasest vaktsineerimiskuurist.
- COVID-19 haigust põdenud vaktsineerida Comirnaty Originaal/Omicron BA.4-5, Spikevax Originaal/Omicron BA. 4-5, Comirnaty (Pfizer/BioNTech) Comirnaty (Pfizer/BioNTech), või Nuvaxovid (Novavax) vaktsiini ühe doosiga kuus kuud pärast läbipõdemist.
- Kui COVID-19 haigust põdenud inimene või inimene, kes haigestus vähem kui kaks nädalat pärast vaktsiinidoosi saamist või on saanud läbipõdemise järgselt ühe või kaks vaktsiinidoosi, siis võib 18+ inimesele võimaldada tõhusdoosi kuus kuud peale viimast vaktsineerimist.
- Kui vaktsineerimiskuuri alustanud inimene haigestus rohkem kui kaks nädalat pärast vaktsineerimiskuuri alustamist COVID-19 haigusesse, siis võib 18+ inimesele kuus kuud pärast läbipõdemist võimaldada tõhusdoosi.
- Kui vaktsineerimiskuuri lõpetanud inimene haigestus COVID-19 haigusesse, siis võib 18+ inimesele kuus kuud pärast läbipõdemist võimaldada tõhusdoosi.

- COVID-19 vaktsineerimised dokumenteeritakse vastavalt 01.07.2022 juhisele: [COVID-19 vaktsineerimise dokumenteerimine \(07.09.2022\)](#)

Gripi vastane vaktsineerimine

Gripi vastu on võimalik vaktsineerida tasuta:

- Rasedatel
- 60+ inimestel
- Väljaspool kodu osutatava ööpäevaringse üldhooldusteenuse saajatel, ööpäevaringse erihooldekandeteenuse saajatel, kogukonnas elamise teenuse saajatel

Leetrid, mumps, punetised

- Ukrainas on laste MMR-vaktsiiniga hõlmatus 87%, mis jääb allapoole soovituslikku karjaimmuunsuse 95% taset. 2021. aastal teatati Ukrainas 16 leetrite juhust.
- Isikutel, kes ei ole leetrid põdenud ja keda ei ole leetrite vastu vaktsineeritud, on soovitatav teha 2 doosi MMR vaktsiini vähemalt 4-nädalase intervalliga.

Difteeria ja teetanus

- dT vaktsiini ühe doosiga immuniseeritakse täiskasvanuid, kes ei ole viimase 10 aasta jooksul revaktsineeritud difteeria ja teetanuse vastu.

Immuniseerimine vältimatu abi korras

Vältimatu abi saamiseks tuleb pöörduda lähima haigla EMO-sse, kus on alati olemas difteeria-teetanuse ja marutõve vaktsiinide varu. Difteeria, teetanuse, B-viirushepatiidi ja tuulerõugete immunoglobuliinid ning difteeria ja botuliini antitoksiinid on saadaval Tartu Ülikooli Kliinikumis ja Lääne-Tallinna Keskhaiglas.